B5

Esters and amides of 9 (Z)-retinoic acid

Priority number(s): DE19951023079 19950626

Also published as: Patent number: EP0751125 JP9012538 (A) **Publication date:** 1997-01-02 DE19523079 (A1) JOHN MICHAEL DR (DE); SIEGEL WOLFGANG DR Inventor: (DE) BASF AG (DE) Applicant: Cited documents: Classification: EP0552624 C07C403/20; C07C403/18; C07D311/72; C07C401/00; - international: FR2212135 C07H13/04; A61K31/20; A61K31/07; A61K31/595; US4677120 A61K31/355; A61K31/70 JP4244058 A61K31/196; A61K31/215; A61K31/232; A61K31/355; - european: JP4244076 A61K31/59H; A61K31/70L15; C07C175/00A7B; more >> C07H13/04D; A61K31/203; C07C175/00A9; C07C401/00; C07D311/72 Application number: EP19960109672 19960617

Abstract of EP0751125

Use of ester and amide derivs. of 9(Z)-retinoic acid having formula (I) for the treatment of cancer is claimed. Y = -OC(R1)2COR2 (a); a gp. e.g. (b)-(i); R1 = H, 1-20C alkyl or 1-20C alkanoyl; R2 = 1-4C alkyl, -CH2OH, -N(R3)2, -CH2-O-CO-R3, or a phenyl, pyridyl, furanyl, thiophenyl of pyrrolyl ring which may be n-substd. (n = 0-5) by X; R3 = H or 1-4C alkyl; X = H, F, Cl, Br, I, OH, OR3, NH2, NO2, CN, NHR3, N(R3)2, SH, SR3, -O-CO-R3, -CO-R3, CHO or COOR3. Cpds. (I) are new where Y = e.g. (b)-(i) or a gp. (t) in which C' = COOMe or CH2COMe.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Europäisches Patentamt
European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0-751 125 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 02.01.1997 Patentblatt 1997/01

(21) Anmeldenummer: 96109672.4

(22) Anmeldetag: 17.06.1996

(51) Int. Cl.⁶: **C07C 403/20**, C07C 403/18, C07D 311/72, C07C 401/00, C07H 13/04, A61K 31/20, A61K 31/07, A61K 31/595, A61K 31/355, A61K 31/70

(84) Benannte Vertragsstaaten: CH DE FR GR LI NL

(30) Priorität: 26.06.1995 DE 19523079

(71) Anmelder: BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:

John, Michael, Dr.
 67245 Lambsheim (DE)

Siegel, Wolfgang, Dr.
 67117 Limburgerhof (DE)

(54) Ester und Amide der 9 (Z)-Retinsäure

(57) Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure zur Behandlung von Carcinomen, neue 9(Z)-Retinsäurederivate, Pharmazeutische Zusammensetzungen enthaltend als antikrebswirksame Wirkstoffe Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure sowie die Verwendung von Estern und Amiden der 9(Z)-Retinsäure zur Behandlung und Prophylaxe von Carcinomen.

Beschreibung

5

10

15

25

30

35

an

50

Die Erfindung betrifft Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure zur Behandlung von Carcinomen, neue 9(Z)-Retinsäurederivate sowie pharmazeutische Zusammensetzungen enthaltend Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure sowie die Verwendung derselben zur Behandlung von Carcinomen

Retinsäuren (Vitamin-A-Säuren) sind Derivate von Vitamin-A (Retinol), die ein großes Spektrum biologischer Aktivitäten, wie celluläre Differenzierung u.v.a. umfassen. Ihre biologische Wirksamkeit wird durch die Wechselwirkung mit zwei Familien von Kernrezeptoren (RA-Rezeptor und RX-Rezeptor) ermöglicht (vgl. Mol. Cell. Biol. 14 Nr.4 (1994) Seiten 2323 - 30).

Die Anwendung von all-(E)- oder 13-(Z)- Retinsäuren oder deren Derivaten in der Therapie von Akne ist lange bekannt. (vgl. US 3,729,568 und EP 366 713). Eine Verwendung von 9-(Z)-Retinsäure in der Krebsbehandlung wird erst seit der Identifizierung spezifischer Rezeptorsysteme erwogen [vgl. Cell 68 (1992) S. 397 - 406; Nature 361 (1993) S. 657 - 60; Nucl. Acid Research 21, Nr. 5 (1993) S. 1231 - 37; Differentiation 54 (1993) S. 123 - 29; J. Bio. Chem. 269 (1994) S. 16689 - 95, Blood 82, Nr. 12 (1993) S. 3592 - 99; Blood 82, Nr. 10 (1993) S.22].

Wie bereits von den Strukturisomeren all-E- und 13 (Z)-Retinsäure bekannt ist, treten auch bei der Anwendung von 9(Z)-Retinsäure teilweise starke Nebenwirkungen auf, so daß das Ausmaß an Nebenreaktionen die erzielte Wirkung überproportional überkompensiert. Zudem führt die topische Anwendung der freien 9(Z)-Retinsäure häufig zu starken Hautreizungen und Schmerzen für den Patienten in Abhängigkeit von Konzentration und Häufigkeit der Applikation. Art und Zahl der Nebenwirkungen reduziert die Möglichkeit einer Therapie mit hohen Dosen an freier 9(Z)-Retinsäure und schränkt die Anzahl der Applikationsgebiete ein.

Es wurde nun gefunden, daß bestimmte Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure auch zur Behandlung von Carcinomen verwendet werden können, dabei aber nur wenige, wenn überhaupt, Nebenwirkungen zeigen. Die vorliegende Erfindung betrifft daher leicht herstellbare Derivate von 9(Z)-Retinsäure, die von Bedeutung für die Behandlung von Carcinomen unter gleichzeitiger Minimierung von toxikologischen Nebenwirkungen der freien 9(Z)-Vitamin-A-Säure sind

Gegenstand der Erfindung sind daher Verbindungen für die Verwendung zur Behandlung von Carcinomen der allgemeinen Formel I

$$C = \begin{pmatrix} \lambda & (1) & \lambda \\ 0 & (1) & \lambda \end{pmatrix}$$

in der Y für feigende Resid siehen kann.

$$-0-cn^{3}-co-n^{2}$$

worin R¹

für H oder C₁-bis C₂₀-Alkyl oder C₁-bis C₂₀-Alkanoyl, vorzugsweise für H oder C₁- bis C₄-Alkyl steht und R² für C₁-bis C₄-Alkyl, -CH₂OH, -NR³₂, -CH₂-O-CO-R³,

steht, und worin R³ für H oder C₁-bis C₄-Alkyl steht,

X für H, F, Cl, Br, J, -OH, -OR³, -NH₂, -NO₂, -CN, -NHR³, -NR³, -SH, -SR³, -O-CO-R³, -CO-R³, -CHO oder -CO-OR³

und n für eine ganze Zahl von 0 bis 5 steht

Oder aber Y für

 $_{55}$ worin $\mathrm{R^{1},\,R^{3},\,X}$ und n die oben angegebene Bedeutung haben und $\mathrm{R^{4}\,f\bar{u}r}$ -CO-OR 3 , -CO-R 3 oder

$$-CO-R_2^3 X_n$$

steht,

5

15

20

wobei in den Verbindungen, in denen mehrere Reste R¹, R², R³ und/oder R⁴ enthalten sind, diese gleich oder verschieden sein können, oder aber

Y für einen der Reste

OR5 OR5

OR5 R50 OR5

25 R300C oder OR5 30

R300C OR5

35

40

45

in der R³ die oben angegebene Bedeutung hat und R⁵ für H oder einen C₁-bis C₄-Alkylrest oder C₁ -bis C₄-Alkanoylrest steht.

Von besonderer Bedeutung für die Verwendung bei der Behandlung von Carcinomen sind Verbindungen der allgemeinen Formel I worin Y für den Rest

steht, in der R1 für H,

X für F, -OH, -OCH3, -NH2, -CN- -NHCH3 oder -N(CH3)2 steht und n eine ganze Zahl von 1 bis 5, vorzugsweise 1 bis 3, insbesondere 1 bis 2, bedeutet,

sowie die Verbindungen der allgemeinen Formel I,

worin Y für einen der Reste

steht,

5

10

worin R^5 H oder C_1 -bis C_4 -Alkanoyl, wie CH_3 -CO-, C_2H_5 -CO-, C_3H_7 -CO oder aber HCO- und R^3 H, C_1 -bis C_4 -Alkanoyl bedeuten,

insbesondere

Verbindungen der allgemeinen Formel I, in der Y einen der Reste

CH₃COO

bedeuten.

50

Die erfindungsgemäßen 9(Z)-Retinsäurederivate können sowohl lokal, d.h. topisch zur Behandlung von Hautkrebs als auch oral, d.h. systemisch, zur Behandlung von Carcinomen oder von Praecancerosen verwendet werden Unter bestimmten Voraussetzungen ist aber auch eine lokale und systemische Prophylaxe von Carcinomen mög-

OCOCH₃

O-COCH₃

lich.

Gegenstand der Erfindung sind daher auch pharmazeutische Zusammensetzungen enthaltend Verbindungen der allgemeinen Formel I neben üblichen pharmazeutischen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln und üblichen pharmazeutisch-technischen Hilfsstoffen sowie die Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel I in Form von Pasten, Gelen, Salben, Cremes, Lotionen, Puder, Lösungen oder Emulsionen enthaltend 0,001 bis 5 % dieser Verbindungen für die lokale Behandlung von Carcinomen oder Praecancerosen sowie die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel I in Form von Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Kapseln, Pillen, Pulver, Granulat, Lösungen oder Suspensionen für die systemische Behandlung von Carcinomen oder Praecancerosen und die Verwendung von pharmazeutischen Zusammensetzungen enthaltend Verbindungen der allgemeinen Formel I für die lokale oder systemische Prophylaxe von Carcinomen.

Die Herstellung der therapeutischen Mittel oder Zubereitungen mit üblichen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln und gegebenenfalls üblichen pharmazeutisch-technischen Hilfsstoffen, entsprechend der gewünschten Applikationsart mit einer zur Anwendung geeigneten Dosierung erfolgt in an sich bekannter Weise, insbesondere durch Vermischen. Die therapeutischen Mittel enthalten die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen bei lokaler Anwendung in Mengen von 0,001 bis 5 Gew.-%, bevorzugt in 0,001 bis 1 Gew.-% und bei systemischer Anwendung vorzugsweise in einer Einzeldosis von 0,1 bis 10 mg.

Tests bezüglich der topischen Anwendung werden durch allgemein übliche Testprogramme in der Onkologie auszeführt.

Getestet wird die Unterdrückung von unkontrolliertem Zellwachstum.

Die Herstellung von erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel I wird durch die folgenden Beispiele aufgezeigt.

Beispiel 1

20

35

40

45

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-4'-methyl-acetophenon

50 ml Dimethylformamid wurden im Kolben vorgelegt. Anschließend wurden 0,5 g Kaliumcarbonat und 1,12 g 2-Chlor(4'-methyl)acetophenon sowie 2 g 9(Z)-Retinsäure unter Lichtausschluß zugegeben. Unter Stickstoff wurde der Ansatz für 24 Stunden (h) bei Raumtemperatur (RT) gerührt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch mit 100 ml Wasser versetzt und für 2 h nachgerührt. Die resultierenden Kristalle wurden abgesaugt und 12 h bei Temperaturen von 30°C unter Stickstoff getrocknet. Man erhielt 2,4 g (entsprechend einer Ausbeute von 84 % der Theorie) des oben genannten Produkts. Die Reinigung des Wertprodukts erfolgte durch Umkristallisation aus Isopropanol. Der Schmelzpunkt Fp des umkristallisierten Produkts betrug 126°C. Die NMR-Spektren stimmen mit der formulierten Struktur überein.

Beispiel 2

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-4'-methoxy-acetophenon

Ein Gemisch aus 35 mt Dimethylformamid, 0,5 g Kallumearonnar, 1,23 g 2-Chilor-4'-methoxy abstephenen und 2 g 9(Z)-Retinsäure wurde unter N₂ und unter Lichtausschluß bei RT für 24 h gerührt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch bei 30°C mit 100 ml Wasser versetzt und 2 h nachgerührt. Die resultierenden Kristalle wurden abgesaugt und 12 h unter Stickstoff getrocknet. Man erhielt 2,5 g (entsprechend 88,1 % d. Th.) des oben genannten Produktes. Nach Umkristallisieren aus Isopropanol betrug der Schmelzpunkt 124-126°C.

Beispiel 3

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-4'-fluor-acetophenon

Ein Gemisch aus 30 ml Dimethylformamid, 0,2 g Kaliumcarbonat, 0,54 g 2-Chlor-4'-fluor-acetophenon und 1 g 9(Z)-Retinsäure wurde unter N₂ und Lichtausschluß bei RT 24 h gerührt. Anschließend wurde mit 100 ml Wasser versetzt und 2 h nachgerührt. Nach Abtrennung der Kristalle und 12stündiger Trocknung unter Stickstoff wurden 1,1 g (84,6 % d. Th) des oben genannten Produktes erhalten. Nach Reinigung durch Umkristallisation aus Methanol betrug der Schmelzpunkt 99°C.

Beispiel 4

5

10

15

20

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-3'-fluor-acetophenon

Ein Gemisch aus 50 ml Dimethylformamid, 0,75 g Kaliumcarbonat, 1,8 g 2-Chlor-3'-fluor-acetophenon und 3 g 9(Z)-Retinsäure wurde unter Stickstoff und Lichtausschluß bei RT 24 h gerührt. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch mit 100 ml Wasser versetzt und 2 h nachgerührt. Die resultierenden Kristalle wurden abgesaugt und aus Isopropanol umkristallisiert. Es wurden 3,3 g (85 % d. Th.) des oben genannten Produkts mit einem Schmelzpunkt von 76-79°C erhalten.

Beispiel 5

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-N-(2',6'-dimethyl-phenyl)-acetamid

Ein Gemisch aus 35 ml Dimethylformamid, 0,5 g Kaliumcarbonat, 1,3 g 2-Chlor-N-(2',6'-dimethyl-phenyl)-acetamid und 2 g 9 (Z)-Retinsäure ließ man unter Stickstoff und Lichtausschluß für 24 h bei RT rühren. Anschließend versetzte man das Reaktionsgemisch mit 100 ml Wasser und rührte dann 2 h nach. Die erhaltenen Kristalle wurden 12 h lang unter Stickstoff getrocknet. Durch Umkristallisation aus Isopropanol wurden 2,4 g (91 % d. Th.) des oben genannten Produkts mit einem Festpunkt Fp= 147-148°C erhalten.

Beispiel 6

9(Z)-Retinsäure-N-(p-carboxy-phenyl)-amid

Ein Gemisch aus 10 g 9(Z)-Retinsäure, 2,9 g Pyridin in 650 ml Diethylether wurde auf 0°C abgekühlt. Anschließend wurden bei 0°C 3,5 g Thionylchlorid zugetropft und 2 h bei 0°C nachgerührt. Ausfallendes Pyridiniumhydrochlorid wurde abgetrennt. Das Filtrat wurde danach bei -25°C mit einer Lösung aus 4,1 g p-Amino-benzoesäure in 150 ml Diethylether und 2,9 g Pyridin versetzt. Man rührte für 2 h bei RT nach. Zur Aufarbeitung wurde das Reaktionsgemisch mit eiskalter 1 n HCl und gesättigter NaCl-Lösung extrahiert. Nach Abtrennung der wäßrigen Phase und Entfernung des Lösungsmittels unter vermindertem Druck wurden 11,7 g (93 % d. Th.) des oben genannten Produkts erhalten, das nach Umkristallisieren aus Isopropanol/Ethanol einen Festpunkt Fp von 187°C aufwies.

Beispiel 7

2-[9(Z)-Retinoyloxy]-3',4'-dimethoxy-acetophenon

Ein Gemisch aus 50 ml Dimethylformamid, 0,75 g Kaliumcarbonat, 2,2 g 2-Chlor-3', 4'-dimethoxy-acetophenon und 3 g 9(Z)-Retinsäure wurde unter Stickstoff und Lichtausschluß 24 h bei RT gerührt. Zur Aufarbeitung wurde das Reaktionsgemisch mit 100 ml Wasser versetzt und 2 h bei RT nachgerührt. Die ausgefallenen Kristalle wurden abgesaugt und nach Umkristallisation aus Isoprocanol unter Stickstoff getrocknet. Man erhielt so 3,6 g (96 % d. Th.) idistallines Wernprodukt vom Pp. 180°C.

Deispiel 6

45 N-[1-(D-Glucopyranosyluronosyl)]-9(Z)-retinsäureamid

Ein Gemisch aus 10 g 9(Z)-Retinsäure, 2,9 g Pyridin in 500 mi Diethylether wurde unter Lichtausschluß unter N₂ auf 0°C abgekühlt. Anschließend wurden bei 0°C 3,5 g Thionylchlorid zugetropft und 2 h bei 0°C nachgerührt. Ausgefallenes Pyridiniumhydrochlorid wurde abgetrennt. Das Filtrat wurde danach bei -25°C mit einer Lösung aus 10 g Methyl-(2,3,4-tri-0-acetyl-β-D-glucopyranosyluronosyl)-amin in 150 ml Diethylether und 4,2 g Kaliumcarbonat versetzt. Man rührte für 2 h bei -25°C nach und erwärmte innerhalb von 1 h auf 0°C. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch mit 2 g Kaliumcarbonat und 100 ml Methanol versetzt. Zur Entfernung der Schutzgruppen erfolgte nun ein Zusatz einer 20%igen KOH-Lösung in 150 ml Methanol. Das Reaktionsgemisch wurde für 0,5 h auf 60°C erhitzt, danach auf RT abgekühlt. Nach Extraktion mit Heptan/Essigsäureethylester wurden die Wasserphasen mehrfach mit Methylenchlorid extrahiert. Die Methylenchloridphasen wurden danach unter vermindertem Druck eingeengt. Der verbleibende Rückstand wurde durch Chromatographio an Kieselgel in ein 1 : 1-Isomerengemisch der beiden Anomeren aufgetrennt. Man erhält so ein 1 : 1-Isomerengemisch des oben genannten Produkts; in Mengen von 8,2 g (entsprechend 60 % d. Th.) von einem Festpunkt Fp. von 56-58°C.

Beispiel 9

9(Z)-Retinsaure-tocopherylester

6 g 9(Z)-Retinsäure wurden in 150 ml Diisopropylether gelöst und die Lösung auf 5°C abgekühlt. Anschließend wurden 4,6 g Trifluoressigsäureanhydrid zugetropft und das Reaktionsgemisch auf RT erwärmt. Danach wurde die Lösung von 9,6 g D,L-Tocopherol in 10 ml Diisopropylether zugetropft 1 h bei RT nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurden dem Ansatz bei 20 bis 25°C 20 ml Ammoniak-Wasser zugesetzt. Nach Phasentrennung wurde die organische Phase mit Wasser gewaschen, getrocknet und danach das Lösungsmittel destillativ entfernt. Man erhielt 12 g (entsprechend 84 % d.Th.) des oben genannten Produktes in Form eines orange-gelben Öls, dessen NMR-Daten mit der formulierten Struktur übereinstimmen.

Beispiel 10

5 9(Z)-Retinsäure-ergocalciferylester

Ein Gemisch aus 10 g 9(Z)-Retinsäure, 2,9 g Pyridin und 500 ml Diethylether wurde unter Lichtausschluß und N₂-Schutzgas auf 0°C abgekühlt, bei 0°C 3,5 g Thionylchlorid zugetropft und das Reaktionsgemisch 2 h bei 0°C nachgerührt. Ausgefallenes Pyridiniumhydrochlorid wurde abgetrennt. Das Filtrat wurde bei -25°C mit einer Lösung von 13,2 g Ergocalciferol in 150 ml Diethylether und mit 4,2 g Kaliumcarbonat versetzt. Man rührte 2 h bei -25°C nach und erwärmte dann innerhalb von 1h auf 0°C. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch mit 10%iger wässriger KHCO₃-lösung versetzt und dann mit Wasser gewaschen. Nach destillativer Entfernung des Lösungsmittels erhielt man 15 g des oben genannten Produkts in Form eines dunkelorangen Öls. Die NMR-Spektren entsprechen der formulierten Struktur.

Patentansprüche

25

30

35

40

45

50

55

 Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure für die Verwendung zur Behandlung von Carcinomen mit der allgemeinen Formel I

in der Y für folgende Reste stehen kann:

$$-0 - CR^{\frac{1}{2}} - CO - R^{2}$$

worin R' für H oder C_1 -bis C_{20} -Alkyl oder C_1 -bis C_{20} -Alkanoyl und R^2 für C_1 -bis C_4 -Alkyl, -CH₂OH, -NR $_2^3$, -CH₂-O-CO-R $_2^3$,

$$X_{n_i}$$
 X_{n_i} X_{n_i} X_{n_i} X_{n_i} oder X_{n_i}

steht, und worin R^3 für H oder C_1 -bis C_4 -Alkyl steht, X für H, F, Cl, Br, J, -OH, -OR 3 , -NH $_2$, -NO $_2$, -CN, -NHR 3 , -NR 3 , -O-CO-R 3 , -CO-R 3 , -CHO oder -CO-OR 3 steht und n für eine ganze Zahl von 0 bis 5 steht oder aber Y für

worin R1, R3, X und n die oben angegebene Bedeutung haben und R4 für -CO-OR3, -CO-R3 oder

$$-CO-R_2^3-X_n$$

5


10

15

20


steht, wobei in den Verbindungen, in denen mehrere Reste R¹, R², R³ und/oder R⁴ enthalten sind, diese gleich oder verschieden sein können, oder aber

Y für einen der Reste



$$\begin{array}{c|c}
 & OR^5 \\
 & OR^5
\end{array}$$
 $\begin{array}{c}
 & OR^5 \\
 & OR^5
\end{array}$

R300C 25 R50 OR5



30

35

40

in der R³ die oben angegebene Bedeutung hat und R⁵ für H oder einen C₁-bis C₄-Alkylrest oder C₁ -bis C₄-Alkanoylrest steht.

2. Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure für die Verwendung bei der Behandlung von Carcinomen mit der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1, worin Y für den Rest

$$0 \le CR_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \le CC - \sqrt{2}$$

45

steht, in der R1 für H,

X für F, -OH, -OCH₃, -NH₂, -CN, -NHCH₃ oder -N(CH₃)₂ steht und n eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeutet.

3. Amide der 9(Z)-Retinsäure für die Verwendung bei der Behandlung von Carcinomen mit der allgemeinen Formel I 50 gemäß Anspruch 1, worin Y für einen der Reste

worin R^5 für H, C_1 -bis C_4 -Alkyl oder C_1 -bis C_4 -Alkanoyl und R^3 für H, C_1 -bis C_4 -Alkanoyl oder C_1 -bis C_4 -Alkyl stehen.

4. Ester und Amide der 9(Z)-Retinsäure der allgemeinen Formel I

in der Y für

steht.

45

50

- Pharmazeutische Zusammensetzung enthaltend Ester oder Amide der 9(Z)-Retinsäure gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 neben üblichen pharmazeutischen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln und üblichen pharmazeutischtechnischen Hilfsstoffen.
- 6. Verwendung von Estern oder Amiden der 9(Z)-Retinsäure gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 in Form von Pasten, Gelen, Salben, Cremes, Lotionen, Puder, Lösungen oder Emulsionen enthaltend 0,001 bis 5 % dieser Verbindung für die lokale Behandlung von Carcinomen oder Praecancerosen.
- 7. Verwendung von Estern oder Amiden der 9(Z)-Retinsäure gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 in Form von Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Kapseln, Pillen, Pulver, Granulat, Lösungen oder Suspensionen für die systemische Behandlung von Carcinomen oder Praecancerosen.

	8.	Verwendung von Pharmazeutischer	Zusammensetzungen gemäß	Anspruch	unspruch 5 für die lokale oder systemisch			
		Prophylaxe von Carcinomen.			-	•		
							• •	
5								
10								
10								
15								
20								
25								
30								
35							•	
40								
45								
50								
55								



EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT Nummer der Anmeldung

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-ühereinkommens für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht gilt

EP 96 10 9672

		GE DOKUMENTE			
(ategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich chen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)	
X	acid ester compound and ulcer therapeut digestive tract* XP002015027 * Zusammenfassung *	Preparation vitamin A ds as antitumor agents dics for skin and NISSHIN FLOUR MILLING	1,4	C07C403/20 C07C403/18 C07D311/72 C07C401/00 C07H13/04 A61K31/20 A61K31/07 A61K31/595 A61K31/355 A61K31/70	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C07C C07D C07H A61K	
Nach Au dung den ist, auf d i echnik : Vollstärn Unvollstä Nicht res	DLLSTÄNDIGE RECH ffassung der Recherchenahteilun Vorschriften des Europäischen ich Grundlage einiger Patentanspidurchzuführen ig ischerchierte Votentansprüchtig recherchierte Patentansprücherchierte Patentansprücherchierte Patentansprücherdie Patentansprücher ir die Beschränkung der Recherch				
Sieh	ne Ergänzungsblatt (
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prifer	
	DEN HAAG			nnevalle, E	
X : von Y : von and A : tech	CATEGORIE DER GENANNTEN i besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung eren Verbffentlichung derselben Kate nologischer Hintergrund itschriftliche Offenbarung	E: illeres Patenti nach dem Ann g mit einer D: in der Anneid gorie L: aus andern Gri	T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentiokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum weröffentlicht werden ist D: lo der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument a: Mitglied der gleichen Patentfamille, übereinstimmendes Dokument		



Europäisches Patentamt EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

EP 96 10 9672

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL6)	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 118, no. 5, 1.Februar 1993 Columbus, Ohio, US; abstract no. 039207, TOYODA H ET AL: "Preparation of vitamin A acid ester compounds as antitumor agents and ulcer therapeutics for skin and digestive tract" XP002015028 * Zusammenfassung * & JP-A-04 244 076 (NISSHIN FLOUR MILLING CO., LTD.) 1.September 1992	1,4	
X	EP-A-0 552 624 (HOFFMANN LA ROCHE) * Seite 3, Zeile 36 - Zeile 39; Ansprüche *	1,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 120, no. 19, 9.Mai 1994 Columbus, Ohio, US; abstract no. 235378, SASS J O ET AL: "9-Cis-retinoylbetaD-glucuronide is a major metabolite of 9-cis-retinoic acid. [Erratum to document cited in CA120(13):152923n]" XP002015029 * Zusammenfassung * & LIFE SCI. (LIFSAK,00243205);94; VOL.54(17); PP.PL 311, FREIE UNIV. BERLIN;INST. TOXIKOL. EMBRYOPHARMAKOL.; BERLIN; D-14195; GERMANY (DE), -/		



Europäisches EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT Patentamt

Nummer der Anmeldung EP 96 10 9672

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL6)	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch			
Υ	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 122, no. 11, 13.März 1995 Columbus, Ohio, US; abstract no. 129040, PATHIRANA C ET AL: "Identification of an activator of the retinoid X receptor" XP002015030 * Zusammenfassung * & J. NAT. PROD. (JNPRDF,01633864);94; VOL.57 (10); PP.1458-61, LIGAND PHARM. INC.;SAN DIEGO; 92121; CA; USA (US),	1			
	ARZNEIMITTEL FORSCHUNG DRUG RESEARCH., Bd. 43, Nr. 4, 1993, AULENDORF DE, Seiten 487-490, XP002015026 F. KALEAGASIOGLU ET AL.: "Antiproliferative activity of retinoic acid and some novel retinoid derivatives in breast and colorectal cancer cell lines of human origin" * das ganze Dokument *	1	RECHERCHIER SACHGEBIETE	TE (Int.Cl.6)	
	FR-A-2 212 135 (BASF AG) 26.Juli 1974 * Ansprüche *	1,4			
A	US-A-4 677 120 (PARISH HARLIE A ET AL) * Ansprüche *	1,4			



EP 96 10 9672 - C -

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung den Vorschriften des Europäischen patentübereinkommens so wenig, daß es nicht möglich ist, auf der Grundlage einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen.

Vollständig recherchierte Patentansprüche: Unvollständig recherchierte Patentansprüche: 1-8 Nicht recherchierte Patentansprüche:

Grund für die Beschränkung der Recherche: Die Zahl, der in den Patentansprüche 1 bis 8 genannten Verbindungen, ist so gross das eine vollständige Recherche nicht möglich ist. Die Recherche beschränkt sich deshalb ausschliesslich auf die Verbindungen beschrieben in den Beispiele 1 bis 10.